

※※2012年4月改訂(第3版)
 製造販売業者の住所変更に伴う改訂等
 ※2008年1月改訂(第2版)

外用殺菌消毒剤

日本標準商品分類番号

872619

※ **アクリノール**「コザカイ・M」
 ※日本薬局方 アクリノール水和物
Acrinol Hydrate

承認番号	16000AMZ02269000
薬価収載	1967年7月
販売開始	1967年7月
再評価結果	1983年4月

貯 法：遮光した気密容器
 使用期限：ラベル等に記載

※【組成・性状】

1. 組 成

本剤1g中に、日局アクリノール水和物1gを含有する。

2. 製剤の性状

本剤は黄色の結晶性の粉末である。

【効能・効果】

化膿局所の消毒

泌尿器・産婦人科術中術後

化膿性疾患(癰、よう、扁桃炎、副鼻腔炎、中耳炎)

口腔領域における化膿局所の消毒

【用法・用量】

化膿局所の消毒

0.05～0.2%の液として使用する。

含 嗽

0.05～0.1%の液で含嗽する。

【使用上の注意】

1. 副 作 用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻 度 不 明
皮 膚 ^{注1)}	塗布部の疼痛、発赤、腫脹等があらわれ、さらに潰瘍、壊死を生じる
過敏症 ^{注2)}	過敏症状

注1) このような症状があらわれた場合には使用を中止し、適切な処を行うこと。

注2) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

外用にのみ使用し、内服しないこと。

※※【薬効薬理】

グラム陽性・陰性菌に有効で、特にレンサ球菌、ウェルシュ菌、ブドウ球菌、淋菌に対し、静菌及び殺菌作用を示す。作用機序としては、生体内でアクリジニウムイオンとなり細胞の呼吸酵素を阻害するといわれている。生体組織にほとんど刺激を与えず、血清やたん白質の存在下でも殺菌力は低下しない。


【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：アクリノール、乳酸エタクリジン

化学名：2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine monolactate monohydrate

分子式：C₁₅H₁₅N₃O·C₃H₆O₃·H₂O

構造式：



分子量：361.39

※性 状：本剤は黄色の結晶性の粉末である。

水、メタノール又はエタノール(99.5)にやや溶けにくい。

本品1gを100mLに溶かした液のpHは5.5～7.0である。

※融 点：約245℃(分解)

【取扱上の注意】

衣類に付着すると黄色に変色し、脱色しにくいので注意すること。

【包 装】

25g

※※【主要文献】

第十六改正日本薬局方解説書C-14 廣川書店(2011)

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部

〒164-0011 東京都中野区中央5-1-10

TEL 03-3381-2004

発売元  吉田製薬株式会社
 東京都中野区中央5-1-10

製造販売元 小堺製薬株式会社
 ※※東京都墨田区両国4-36-9