

口腔用剤

日本標準商品分類番号

87279

複方ヨードグリセリン「ヨシダ」

日本薬局方 複方ヨード・グリセリン

Compound Iodine Glycerin

500mL



ヨシダ製薬

製造販売元

吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951

2015年1月改訂（第6版）

貯法：遮光した気密容器
使用期限：ラベルに記載

承認番号	(61AM)1790
薬価収載	1961年1月
販売開始	1961年1月
再評価結果	1982年8月

【禁忌（次の患者には使用しないこと）】

1. 水銀製剤を使用中の患者〔「相互作用」の項参照〕
2. 本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組成

本剤は1000mL中にヨウ素12g、グリセリン900mL、液状フェノール5mLを含む。

添加物としてハッカ水、ヨウ化カリウムを含有する。

2. 性状

本剤は赤褐色粘稠性の液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】

咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎

【用法・用量】

症状に応じ、適量適量を患部に塗布する。



キャップ：PE
キャップシール：PET

ガラス：ボトル

調剤

販売



(01)04987288223016



(01)14987288223259

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	機序・危険因子
水銀製剤	ヨウ化水銀が発生するおそれがある。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用

アナフィラキシー（頻度不明）：他のヨード製剤においてまれにアナフィラキシー（呼吸困難、潮紅、蕁麻疹等）があらわれることがあるとの報告があるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(2) その他の副作用

種類\頻度	頻度不明
過敏症注)	発疹、口腔粘膜び爛等
甲状腺	血中甲状腺ホルモン値 (T ₃ 、T ₄ 等) の上昇あるいは低下など甲状腺機能異常

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

他のヨード製剤において、先天性甲状腺機能低下症の乳児の報告があるので、妊娠中及び授乳中の婦人には、長期にわたる広範囲の使用を避けること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10

製造番号

使用期限